


FERTI B

Kapalné hnojivo z řady  FERTI®



SLOŽENÍ, VZHLED A VLASTNOSTI

FERTI B je kapalné vícesložkové hnojivo světle hnědé barvy obsahující dusík, fosfor, bor a stopové prvky. Všechny živiny jsou v rychle působící vodorozpuštěné formě.

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ

FERTI B se aplikuje ve zředěném stavu závlahou nebo postřikem a může se používat jak ke hnojení na povrch půdy, tak i k mimokořenové výživě. Je vhodný zejména k rostlinám náročným na fosfor a bor pro půdy s velmi nízkým až vyhovujícím obsahem fosforu. Mimokořenová výživa se používá v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření je u citlivých kultur nebezpečí popálení.

BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Hnojivo se dopravuje v PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem. Skladuje se v polyetylenových, sklolaminátových zásobnících nebo v původních obalech. Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod +5 °C. U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností ±3 %.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vlastnost	Hodnota
Celkový dusík jako N v % hm.	8
Amonný dusík jako N v % hm.	3
Močovinový dusík jako N v % hm.	5
Fosfor jako P ₂ O ₅ v % hm.	10
Bor jako B v % hm.	2
Molybden jako Mo v % hm.	0,002
Měď jako Cu v % hm.	0,005
Zinek jako Zn v % hm.	0,005
Železo jako Fe v % hm.	0,02
Mangan jako Mn v % hm.	0,01
pH zředěného roztoku (1:5)	6–8
Hustota v kg/l při 20 °C	cca 1,24

APLIKACE

Při aplikaci závlahou doporučujeme koncentraci 20 ml (1 víčko od 5 a 20 l balení) na 4 l vody. Připraveným roztokem zalévat půdu s plodinami 1x za 14 dnů.

Plodina	Doba aplikací	Počet aplikací	Dávkování v l/ha
Cukrová řepa	1. ve fázi 4–6 listu 2. postřik před uzavíráním	2	2–5
Řepka olejka	1. ve fázi prodluž. růstu 2. při tvorbě pupat až počátek kvetení	2	2–5
Jádroviny	1. během květu 2. do 3 týdnů po odkvětu 3. po sklizni	3	2
Zelenina	1. 2 týdny po výsadbě, další v intervalu 2 týdnů	3	2
Slunečnice	1. ve fázi 4 listu, další v intervalu min. 3 týdnů do tvorby květu	3	2–5
Kukuřice	1. ve fázi 4 listu, 2. ve fázi 8 listu	2	2–3
Réva vinná	1. 2–3 týdny před květem 2. těsně před květem 3. tvorba bobulí	3	2



U zrodu vašeho úspěchu

LOVOCHEMIE

Tereziánská 57, 410 02 Lovosice
www.lovochemie.cz