


KUPROSOL

Kapalné hnojivo z řady  **LOVOMIKRO®**



SLOŽENÍ, VZHLED A VLASTNOSTI

KUPROSOL je kapalné hnojivo modré barvy obsahující měď v rychle působící vodorozpustné formě.

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ

KUPROSOL se používá při hnojení na půdu a na list. Použití je vhodné jak ke hnojení před začátkem vegetace, tak i ke kurativním zásahům během vegetace v případech, kdy se akutní nedostatek projeví na rostlinách. Rostliny obzvláště náročné na dostatek mědi jsou: jarní a ozimé obiloviny, cukrová řepa, brambory, hrách, bob, slunečnice, cibule, česnek, špenát, paprika, rajčata.

BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Hnojivo se dopravuje v PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem. Hnojivo se skladuje v PE nebo sklolaminátových zásobnících, anebo v obalech výrobce. Teplota výrobku při skladování nesmí klesnout pod +5 °C. U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností ±3 %.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vlastnost	Hodnota
Měď jako Cu v % hm.	5
pH zředěného roztoku (1:5)	3–5
Hustota v kg/l při 20 °C	cca 1,15

APLIKACE

Aplikace na půdu:

Jestliže se na základě půdních rozborů nejedná o extrémní nedostatek mědi, lze obecně doporučit


toto dávkování: lehké půdy 10 l/ha
těžké půdy 25 l/ha.

Listové aplikace:

Pro listovou aplikaci se používá vodný roztok o koncentraci 0,5 %. Při listové aplikaci se dávka na 1 hektar pohybuje v rozmezí 1–2 l. Je možné použít i nižší dávku jako součást optimalizační výživy u rostlin příznivě reagujících na přidávek mědi.

Plodina	Období aplikace	Počet aplikací	Dávkování v l/ha
Obilniny	1. aplikace na počátku vegetace, 2. aplikace po 14 dnech	2	2
Cukrovka	1. aplikace ve fázi 3. listu, 2. aplikace po třech až čtyřech týdnech	2	2
Brambory	zapojení porostu	1	2
Luštěniny	zapojení porostu	1	2
Zahradní plodiny	v průběhu vegetace	2	2

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků a hnojiv na bázi mědi.



U zrodu vašeho úspěchu

LOVOCHEMIE

Tereziánská 57, 410 02 Lovosice
www.lovochemie.cz